

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

CORTf® AT 軟膏

第 2 類醫藥品 濕疹、皮膚炎治療藥。 合成副腎上腺皮質激素 · 外用軟膏

濕疹、皮膚炎是由刺激或過敏反應引起的發炎，大多時候患部會有紅腫、起疙瘩並伴隨搔癢症狀。CORTf AT 軟膏配合了可以穩定控制「發炎」的外用類固醇-潑尼松龍醋酸戊酸酯 (PVA)。也能使用於皮膚的保護機能尚未成熟之兒童的濕疹、皮膚炎外用藥。

⚠ 使用注意事項

⊗ 禁止事項

(違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用)

1. 下列部位禁止使用
水痘 (疱疹)、香港腳、白癬等或是化膿的患部。
2. 請不要在臉部大面積的使用。
3. 請不要長期連續使用。



⚠ 慎用事項

1. 下列患者請向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢後使用。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 孕婦或可能懷孕的患者。
 - (3) 有藥物過敏史的患者。
 - (4) 患部面積大的患者。
 - (5) 浸潤和潰爛嚴重者。

2. 使用後出現下列症狀時，有可能是副作用，請立即停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有合法販賣許可證者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢
皮膚 (患處)	腳氣、癬等的白癬、粉刺、化膿、持續的刺激感

3. 用藥 5-6 天後症狀未見好轉時請停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢。

功用 適用於濕疹、皮膚炎、斑疹、搔癢、蚊蟲叮咬、痱子、蕁麻疹、凍瘡

用法用量 1 日數次，請適當的塗抹於患部。

<用法用量相關的注意事項>

- (1) 請嚴格按用法用量使用。
- (2) 用於兒童時，請在監護人的指導下使用。
- (3) 請注意不要接觸到眼睛。如果不慎接觸到眼睛，請立即用自來水或溫水沖洗。
嚴重時請至眼科就診。
- (4) 本產品僅供外用。

成份 (1g 中)


成份	含量	功效
潑尼松龍醋酸戊酸酯 (合成腎上腺皮質激素)	1.5mg	可抑制皮膚的發炎、紅腫
利多卡因	10mg	可抑制患部的搔癢、疼痛
異丙基甲基酚	1mg	患部殺菌
醋酸生育酚 (維他命 E)	5mg	促進血液循環，讓症狀及早恢復

添加物：肉荳蔻酸異丙酯、棕櫚醇、鯨蠟基-PG 羥乙基棕櫚醯胺、液體石蠟、凡士林、石蠟

保管及使用的注意事項

- (1) 請避免日光直射，陰涼乾燥處密封保存。
- (2) 請保存在兒童接觸不到的場所。
- (3) 請不要更換容器。(容易導致誤用和變質)
- (4) 請不要使用過期的製品。



販賣商
 田邊製藥株式会社
大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販賣商
JAPAN MEDIC 株式會社
富山市橫越 168 產販賣商

