

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

# CORTf<sup>®</sup> AT 软膏

第2类医药品 湿疹、皮炎治疗药。 合成副肾上腺皮质激素・外用软膏

湿疹、皮炎是因异物刺激和过敏反应等引起的皮肤炎症，多数情况下，患部会变得红肿、起疹和伴有瘙痒。CORTfAT 软膏配有外用甾体-泼尼松龙醋酸戊酸酯（PVA），它能够温和抑制上述症状根源的“炎症”。是一种对皮肤屏障功能尚未成熟的儿童的湿疹、皮炎也可使用的软膏型外用制剂。

## ⚠ 使用注意事项

### ⊗ 禁止事项

（违反时则症状加重或易出现副作用）

1. 下列部位请禁用  
水痘、脚气、癣等的部位或化脓的患处。
2. 请不要在颜面部大面积使用。
3. 请不要长期连续使用。



### ⚠ 慎用事项

1. 下列患者请向医生、药剂师或持有销售许可证者咨询后使用。
  - (1) 正在接受医生治疗的患者。
  - (2) 孕妇或有可能怀孕的患者。
  - (3) 有药物过敏史的患者。
  - (4) 患处面积大的患者。
  - (5) 浸润、溃烂严重的患者。
2. 使用后出现下列症状时，有可能是副作用，请立即停药，并持此说明书向医生、药剂师或持有销售许可证者咨询。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
皮肤(患处)	脚气、癣等的白癣、粉刺、化脓、持续刺激感

3. 用药 5~6 日后症状未见好转时，请停药，并持此说明书向医生、药师或持有销售许可证者咨询。

**功用** 适用于湿疹、皮炎、斑疹、瘙痒、蚊虫叮咬、痱子、荨麻疹。

**用法用量** 1 日数次，请适量涂于患部。

#### <用法用量相关的注意事项>

- (1) 请严格按用法用量使用。
- (2) 用于儿童时，请在监护人的指导下使用。
- (3) 请注意不要弄入眼睛。如果不慎弄入眼内，请立即用自来水或温水冲洗。  
严重时请去眼科就诊。
- (4) 本品仅供外用。

## 成分（1g 中）

成分	含量	功能
泼尼松龙醋酸戊酸酯（合成肾上腺皮质激素）	1.5mg	抑制皮肤的炎症、红肿
利多卡因	10mg	抑制患部瘙痒和疼痛
异丙基甲基苯酚	1mg	给患部杀菌
醋酸生育醇酯（维生素 E）	5mg	促进血液循环，加速症状恢复

辅料：肉豆蔻酸异丙酯、十八十六醇、N-（十六烷氧基羟丙基）-N-羟基十六酰胺、液体石蜡、凡士林、石蜡

## 保管及使用的注意事项

- (1) 请避免日光直射，阴凉干燥处密封保存。
- (2) 请在儿童接触不到的场所保存。
- (3) 请不要更换容器。（容易导致误用和变质）
- (4) 请不要使用过期的制品。



销售商  
**田边制药株式会社**  
大阪市中央区道修町 3-2-10

制造销售商  
JAPAN MEDIC 株式会社  
富山市横越 168

