

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。



適用於胃脹・噁心：

田邊胃腸藥 <調律>

第2類
醫藥品

「胃脹」「胃部沉重」「噁心」等胃不適症狀的原因之一是由於胃腸運動功能的低下。田邊胃腸藥<調律>是由本公司研製開發，其成份中配合有胃腸運動節律調節劑 TM ((±)-3, 4, 5-三甲氧基苯甲酸丁酯馬來酸鹽、英文名：Trimebutine maleate) 的胃腸藥。本藥可作用於胃腸道的內外外部，經外部發揮其 TM 功效、促進胃腸協調活動；經內部發揮其（促進消化・抑制胃酸・修復黏膜）功能，從而改善各種胃不適症狀。

■ 適用於下列症狀



胃脹

噁心

腹脹

胃不適



服用注意事項

禁忌

[如違反以下禁忌事項則可能症狀加重或易出現副作用]

1. 正在接受透析治療的患者禁用本藥。
2. 在服用本藥期間，禁止服用以下藥物。
胃腸鎮痛鎮靜藥
3. 哺乳期間禁用，或在服用本藥期間停止哺乳。
(本藥經由母乳有可能導致嬰兒脈搏過快。)
4. 禁止長期服用。

需諮詢

1. 下列患者應向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢後使用。
 - (1) 正在接受醫生治療的患者。
 - (2) 孕婦或可能懷孕的患者。
 - (3) 高齡患者。
 - (4) 曾因藥物等引起過敏的患者。
 - (5) 有以下症狀的患者：排尿困難。
 - (6) 患有以下疾病的患者：腎臟病、肝病、心臟病、青光眼、甲狀腺功能障礙。
2. 使用後出現下列症狀時，有可能是副作用，請立即停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有合法販賣許可證者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	皮疹、發紅、搔癢
精神神經系統	睏倦、暈眩、疲勞、頭痛
其他	心跳過快、口內麻痺、腹鳴

極少數情況下有可能出現以下嚴重症狀，應立即接受醫生治療。

症狀的名稱	症狀
肝功能障礙	發燒、搔癢、皮疹、黃疸（皮膚或眼白發黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

3. 使用後有出現下列症狀的可能，如這些症狀持續或加重的話，請立即停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有合法販賣許可證者諮詢。
口渴、便秘、腹瀉
4. 服用 2 週左右症狀仍未改善的話，應停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢。

其他使用注意事項

有母乳汁分泌減少的可能。

適用症狀

- 胃脹、胃部沉重
- 噁心（反胃、酒後不醒、酒後噁心）、胃不適
- 过饮、过食（促进消化）、因消化不良引起的腹脹
- 食欲不振、胃弱、消化不良、胸悶
- 胃痛、胃灼熱感（燒心）、胃酸過多、暖氣、嘔吐

用法・用量

飯後 30 分鐘左右內，用涼溫開水服用。用量如下。

年齡	1 次用量	1 日服用次數
成人（15 歲以上）	2 片	3 次
未滿 15 歲兒童	禁止服用	

<用法・用量的注意事項>

- (1) 嚴格按用法・用量服用。
- (2) 藥片的取出方法：

- 如右圖，請用手指用力按壓包裝板的凸面，則反面的鋁箔包裝會被壓破開，即可取出藥片服用。
（如不慎連鋁箔包裝一同誤服的話，有可能造成刺傷食道黏膜等不可想像的嚴重後果。）
- 如果是瓶裝則不需用上述方法。



成份

6 片中含量：

	成份	含量	功效
	馬來酸曲美布汀（TM）	300 mg	促進腸胃協調活動
	複合消化酶 2000	120 mg	助消化
	脂肪酶 AP6	45 mg	助消化
	甘草末	150 mg	抑制黏膜發炎並修復黏膜
	賽莨菪萃取液	30 mg	抑制胃酸過多分泌
	碳酸氫鈉	300 mg	中和胃酸
	沉澱碳酸鈣	600 mg	中和胃酸
	矽鋁酸鎂（按乾燥物換算）	240 mg	中和胃酸

添加物：D-甘露醇、聚維酮、羧甲基纖維素、硬脂酸鎂、L-薄荷醇、乳糖、乙基纖維素、纖維素、二氧化矽

保管中應注意事項

- (1) 請避免日光直射，陰涼乾燥處密封保存。
- (2) 請保存在兒童接觸不到的場所。
- (3) 請不要更換容器。（容易導致誤用和變質）。
- (4) 瓶裝製品應隨時旋緊瓶蓋。
- (5) 請不要服用過期的製品。



生產販賣商 田邊製藥株式会社
 地址：大阪市中央區道修町 3-2-10
 郵遞區號：541-8505