

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

CORT f HEPAMEDI HD 乳液

第2類醫藥品 乾燥性皮膚治療藥 添加類肝素物質 皮膚外用藥

CORT f HEPAMEDI，是一款用於治療乾燥問題引發的「頭皮搔癢」之治療藥。直接將CORT f HEPAMEDI塗抹在頭皮搔癢的地方，除了有效達到消炎止癢效果的同時，保濕成分類肝素物質也可幫助頭皮恢復正常。

⚠ 使用注意事項

⊗ 禁止事項

(違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用)

1. 下列情況者請勿使用。

- (1) 出血性血液疾病(血友病、血小板減少症、紫癍病等)患者。
- (2) 即使輕微出血也可能導致嚴重後果的患者(因具有抑制血液凝固的作用，而有可能會助長出血)。
- (3) 異位性皮膚炎患者(即使症狀輕微，也需要在醫師指導下接受適當的治療)。



■ 慎用事項

1. 下列情況者於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
- (3) 浸潤或潰爛嚴重者。
- (4) 經由醫師診斷為異位性皮膚炎者。

2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、腫脹

3. 即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，並攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

效能

伴有搔癢症狀的乾燥性皮膚(成人/老人乾皮症、兒童的乾燥性皮膚)

用法用量


1日1~數次，請取適量塗抹於患部。

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 使兒童使用的情况下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請注意避免接觸眼睛。萬一誤入眼中，請立即以水或溫水清洗。若症狀極為嚴重，請前往眼科接受治療。
- (4) 僅限外用。

容器的使用方法

- 使用前，請將蓋子打開並將容器瓶尖朝上，用手指按壓多次內栓以排出內部空氣。
- 使用時請將容器朝下，並且稍微傾斜，使瓶尖處輕壓患部以進行塗抹。過度按壓瓶尖，或用力擠壓容器會擠出大量藥液，請多加注意。



成分（100g 內含）

成分	含量	功效
類肝素物質	0.3 g	有增強皮膚保水的作用。
苯海拉明	1 g	可抑制搔癢。
甘草酸二鉀	1 g	可抑制皮膚發炎。

添加物：聚乙二醇、檸檬酸水合物、檸檬酸鈉水合物、鯨蠟醇聚氧丙烯聚氧乙炔醚、氯化鈉、對羥基苯甲酸酯、聚維酮

保管及使用上的注意事項

- (1) 請直立並密封保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）
- (4) 使用時請注意不要讓液體滴落。
- (5) 請注意避免滴落在鐘錶、眼鏡等金屬類、塑膠類、化學纖維類、皮革製品、已塗裝之地板、家具等物品上。（因有導致變色、變質的可能。）
- (6) 沾染到染過的頭髮上也可能導致掉色。
- (7) 請不要使用過期的製品。



販售商

田邊製藥株式會社
大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販賣商

JAPAN MEDIC 株式會社
富山市橫越 168

正確明白、正確治療。



健康的人的頭皮具備適當的水潤與彈性，會保護身體不受過敏原或微生物等外部刺激傷害。但由於生活習慣或環境等，皮脂分泌減少後，皮脂膜會變薄、角質層中水分減少，所以容易乾燥。乾燥的頭皮保護功能會下降，稍微的刺激就可能導致過敏反應，並引發難以忍受的搔癢。為了不引發此類皮膚問題，最重要的便是日常進行保濕工作。

因乾燥而引起的頭皮搔癢處理方法

因過度洗髮或年齡增長，導致皮脂減少等因素，致使頭皮處於乾燥狀態時就會出現搔癢。此外，頭皮上還可能會出現粉一樣的細小頭皮屑。

在這種情況之下，我們推薦您使用可為頭皮帶來滋潤感的 **CORT f HEPAMEDI HD**。除了消炎止癢的效果之外，主成分類肝素物質可攜帶水分滲入頭皮，從內部達到保濕的效果，並維持不易乾燥的狀態，使頭皮恢復正常狀態。

