

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

CORT f HEPAMEDI 油性乳膏

第 2 類醫藥品 乾燥性皮膚治療藥 添加類肝素物質 皮膚外用藥

CORT f HEPAMEDI 是一款可透過主成分類肝素物質滲透至肌膚深處，從內部保濕的同時，還能藉由油性乳膏的性質覆蓋皮膚表面，以保護患部不受外部刺激，並維持不易乾燥的狀態的治療藥。

⚠ 使用注意事項

⊗ 禁止事項

(違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用)

1. 下列情況者請勿使用。
 - (1) 出血性血液疾病(血友病、血小板減少症、紫癜病等)患者。
 - (2) 即使輕微出血也可能導致嚴重後果的患者(因具有抑制血液凝固的作用，而有可能會助長出血)。
2. 請勿使用於下列部位。
眼睛和眼睛周圍、黏膜(口腔、鼻腔、陰道等)。



⚠ 慎用事項

1. 下列情況者於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - (1) 正在接受醫師治療者。
 - (2) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
 - (3) 浸潤或潰爛嚴重者。
2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、搔癢、腫脹、紫癢

3. 即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，並攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

效能

手指粗糙、手足裂紋/龜裂、凍瘡(不包含潰爛)、肘部/膝部/腳跟/腳踝的角化症、乾皮症、兒童的乾燥性皮膚、外傷或燒燙傷後的皮膚硬塊和緊繃(不包括臉部)、跌打損傷/扭傷後的腫脹、肌肉痛、關節痛

用法用量

1 日 1~數次，請取適量塗抹於患部，或塗在紗布等上再貼於患部。

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請注意避免接觸眼睛。萬一誤入眼中，請立即以水或溫水清洗。若症狀極為嚴重，請前往眼科接受治療。
- (4) 僅限外用。

成分(100g 內含)

成分	含量	功效
類肝素物質	0.3g	有增強皮膚保水的作用。
生育酚醋酸酯 (維他命 E 醋酸酯)	0.5g	改善皮膚血液循環、幫助粗糙皮膚再生。

添加物：脂肪酸甘油酯、聚氧乙烯化蓖麻油、角鯊烷、凡士林、液體石蠟、石蠟、微晶蠟、糊精棕櫚酸酯、聚二甲基矽氧烷、十甲基環五矽氧烷、甘油、硫酸鎂水合物、對羥基苯甲酸酯

保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器(可能導致誤用或變質。)
- (4) 請不要使用過期的製品。



販售商

田邊製藥株式會社

大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販賣商

JAPAN MEDIC 株式會社

富山市橫越 168

正確明白、正確治療。




健康的人體皮膚表面會分泌一層由皮脂與汗水混合形成的皮脂膜，它可保持皮膚水潤與彈性，並保護自身不受過敏原或微生物等外部刺激傷害。但由於生活習慣或隨年齡增長等，皮脂分泌減少後，皮脂膜會變薄、角質層中水分減少，所以容易乾燥。乾燥的肌膚保護功能會降低，對於一點點刺激都會引發過敏反應，並伴有因發炎而導致的紅腫搔癢。為了不引發此類皮膚問題，最重要的便是日常進行保濕工作。

手部粗糙的處理方法

日常生活中手部變得粗糙，或者抓一下就長疹子，這都是因為反復進行的清潔工作、洗手或使用酒精消毒等刺激導致肌膚變得乾燥的證據。若放置不管，乾燥問題愈發嚴重，那麼肌膚可能進一步產生裂紋，搔癢的感覺也會愈演愈烈。

在這種情況之下，我們推薦您使用可為皮膚帶來滋潤感的 **CORT f HEPAMEDI**。主成分類肝素物質可攜帶水分滲入肌膚深處，從內部保濕的同時，還能藉由油性乳膏的性質覆蓋皮膚表面，以保護患部不受外部刺激，並維持不易乾燥的狀態，使肌膚恢復正常狀態。

<清潔工作、頻繁洗手、消毒引起的乾燥 導致手部粗糙>



<CORT f HEPAMEDI 的作用>

