

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

CORT f HEPAMEDI 油性乳膏

第 2 类医药品 干燥性皮肤治疗药 含有类肝素物质 皮肤外用药

CORT f HEPAMEDI 是一种治疗药物，其主要成分为类肝素物质，可以渗透至皮肤深层，从内部发挥保湿作用，同时油性乳膏覆盖皮肤表面，保护患处免受外部刺激，维持不易干燥的湿润状态。

⚠ 使用注意事项

⊗ 禁止事项

(违反时则症状加重或易出现副作用)

1. 以下人士请禁用。

- (1) 患有出血性血液疾病（血友病、血小板减少症、紫癜病等）的人士。
- (2) 即使轻微出血也会造成严重后果的人士（因具有抑制血液凝固的作用而有可能使出血更严重）。

2. 不要用于下述部位。

眼睛和眼周、粘膜（如口腔、鼻腔、阴道等）。



慎用事项

1. 以下人士在服用前应咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医生治疗的患者。
- (2) 有药物等过敏史的患者。
- (3) 湿润或糜烂较为严重的人士。

2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、瘙痒、肿胀、紫癜

3. 若使用 5~6 天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

功能

手指粗糙、手脚皮肤干裂或皲裂、冻伤（不包括糜烂）、肘部、膝盖、脚后跟及脚踝皮肤角化症、皮肤干燥症、小儿干燥性皮肤，外伤及烧伤后的皮肤硬块和紧绷（不包括面部）、打伤及扭伤后的肿胀、肌肉疼痛、关节疼痛

用法用量

1 天 1~几次，请取适量涂抹于患处或抹在纱布等上敷于患处。

<用法用量相关的注意事项>

- (1) 请严格按用法用量使用。
- (2) 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- (3) 请注意避免接触到眼睛。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。并且，症状严重时应前往眼科就诊。
- (4) 仅限外用。

成分（100g 内）

成分	含量	功能
类肝素物质	0.3g	具有增强皮肤锁水力的作用。
生育酚乙酸酯 (维生素 E 乙酸酯)	0.5g	改善皮肤的血液循环，有助于粗糙皮肤的再生。

添加物：甘油脂肪酸酯、聚氧乙烯氢化蓖麻油、角鲨烷、凡士林、液体石蜡、石蜡、微晶蜡、糊精棕榈酸酯、聚二甲基硅氧烷、十甲基环五硅氧烷、甘油、硫酸镁水合物、对羟基苯甲酸酯

保管及使用的注意事项

- (1) 密闭保管在避免阳光直射、干燥的阴凉场所。
- (2) 请在儿童接触不到的地方保存。
- (3) 请勿转移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用过期产品。



销售商

田边制药株式会社

大阪市中央区道修町 3-2-10

制造销售商

JAPAN MEDIC 株式会社

富山市横越 168

正确认知、正确治疗。




健康的人体皮肤表面覆盖着由人体分泌的皮脂和汗液混合形成的皮脂膜，可以保持皮肤的水润和弹性，并保护自身不受外界过敏原和微生物等刺激。但是，由于生活习惯或年龄增长等因素导致皮脂分泌减少，皮脂膜变薄，角质层水分减少，头皮会变得容易干燥。对于干性皮肤来说，由于皮肤的屏障功能下降，所以即使受到轻微刺激也会出现过敏反应，并伴有炎症引起的发红和瘙痒。为了避免此类皮肤问题的发生，从平日起就注重保湿非常重要。

手部皮肤粗糙问题的解决办法

平时手部皮肤干燥粗糙，抓挠后会出现小疹子，这就是皮肤反复进行接触水的工作、洗手或使用酒精消毒等原因导致皮肤干燥加剧的证据。如果置之不理，将会导致皮肤干燥情况进一步加剧，甚至出现裂纹、瘙痒加剧之类的问题。遇到这种情况，我们建议使用能够滋润皮肤的 CORT f HEPAMEDI。其主要成分是类肝素物质，可以渗透至皮肤深层，从内部锁住水分发挥保湿作用，同时油性乳膏覆盖皮肤表面，保护患处免受外部刺激，维持不易干燥的湿润状态，使皮肤恢复正常。

<进行接触水的工作、洗手、消毒所造成的干燥而导致手部皮肤粗糙>



<CORT f HEPAMEDI 的功能>

