

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

Medipure N 第 2 類醫藥品 抗過敏藥

Medipure N 是一款以口服方式治療敏感部位搔癢的藥物。即使在外出等不易用藥的情況下，也無需飲用水，即可立即服用的蜜桃薄荷味咀嚼錠。

⚠ 使用注意事項

⊗ 禁止事項

(違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用或發生意外)

1. 下列情況者請勿服用。

- (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀者。
- (2) 苯酮尿症患者。(本藥劑含有 L-苯丙氨酸化合物。)

2. 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任一種醫藥品。

其他過敏用藥、含有抗組織胺劑的內服藥等(感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎用內服藥、暈車藥等)

3. 服藥後，請避免開車，或進行機械類的駕駛操作。

(可能出現嗜睡問題等。)

4. 請勿長期服用。

5. 服用前後，請勿飲酒。



■ 慎用事項

1. 下列情況者於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 孕婦或可能懷孕者。
- (3) 正在哺乳者。
- (4) 年長者。
- (5) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
- (6) 有下列症狀者：
排尿困難
- (7) 曾被診斷過下列疾病者：
青光眼

2. 服藥後，若出現下列症狀即有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	噁心嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神經系統	頭痛、頭暈
泌尿器官	排尿困難

罕見的情況下會發生下列嚴重症狀。請立即接受醫師治療。

症狀的名稱	症狀
休克 (過敏性)	服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸(皮膚或眼白變黃)、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等症狀
血小板減少	因血液中的成分——血小板的數量減少，出現流鼻血、牙齦出血、瘀青等出血症狀

(翻面繼續)

3. 服用後，可能出現下列症狀，如此類症狀有持續或變嚴重的情況時，請停止服用，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、嗜睡

4. 如服用 5~6 天後，症狀仍沒有改善，請停止服用，並攜帶本說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

功效、效果

因濕疹、斑疹造成的發癢、鼻炎、蕁麻疹

用法用量


成人（15 歲以上）1 次 1 錠、1 日 2 次（早晚），請咀嚼或使其在口中溶解後服用。
請勿給未滿 15 歲的兒童服用。

<用法用量相關注意事項>

(1) 請嚴格遵守規定的用法用量。

(2) 錠劑的取出方法

請按照右圖所示，用指尖用力按壓錠劑所在的泡罩上的凸起部分，破壞背面的薄膜，取出錠劑後再服用。（如不小心連同泡罩一起吞下，可能會導致食道黏膜刺傷等意外情況。）



成分及其功效


成人 1 日服用量（2 錠）中，含有以下成分。

成分	分量	功效
Mequitazine	4mg	通過其抗過敏作用，可抑制皮膚發癢或鼻炎。

添加物含有以下成分：D-甘露醇、矽酸鋁鎂、羥丙基纖維素、單寧酸、蔗糖素、交聯聚維酮、阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物）、檸檬酸水合物、L-薄荷醇、硬脂酸鎂、香料。

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中。
（可能會造成誤食或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



販售商

田邊製藥株式會社

大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販賣商

Teika 製藥株式會社

富山市荒川一丁目 3 番 27 号