

以上资料仅供参考，详情请参阅产品附件之文件。

Medipure N 第 2 类药品 抗过敏药

Medipure N 是一种可以通过口服治疗敏感区域瘙痒的药物。这是一种即使在外出等不方便服药的情况下，也可以不需要喝水就能立即服用的蜜桃薄荷味的咀嚼片。

使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现不良反应及事故)

1. 下列患者请禁用。

- (1) 曾因本药剂或本药剂的成分引起过过敏症状的人群。
- (2) 患有苯丙酮酸尿症的人士。(因为本药剂中含有 L-苯丙氨酸化合物。)

2. 在服用本药剂期间，请勿使用以下任何药品。

其他抗过敏药、含抗组胺剂的内服药等(感冒药、镇咳祛痰药、鼻炎用内服药、晕车药等)

3. 服用后，请勿进行交通工具或机械类的驾驶操作。

(可能会出现嗜睡等情况。)

4. 请不要长期连续使用。

5. 服用前后请勿饮酒。



慎用事项

1. 以下人士在服用前应咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

- (1) 正在接受医生治疗的人士。
- (2) 孕妇或有可能已怀孕的女性。
- (3) 哺乳期的女性。
- (4) 老年患者。
- (5) 曾因药物等引发过过敏症状的人士。
- (6) 存在以下症状的人士。
排尿困难
- (7) 诊断为以下疾病的人士。
青光眼

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

| 相关部位 | 症状 |
|--------|---------------|
| 皮肤 | 发疹、发红、瘙痒 |
| 消化系统 | 恶心、呕吐、食欲不振、腹痛 |
| 精神神经系统 | 头痛、眩晕感 |
| 泌尿系统 | 排尿困难 |

极少数情况下有可能出现以下严重症状。此时请立即接受医生治疗。

| 症状名称 | 症状 |
|-------------|---|
| 休克 (过敏性) | 服用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状 |
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、皮疹、黄疸(皮肤或眼白变黄)、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状 |
| 血小板减少 | 因血液中血小板数量减少导致鼻血、牙龈出血、淤青等出血症状 |

(接背面)

3. 服用后，可能会出现以下症状，如果发现这些症状持续或加重时，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

口干、嗜睡

4. 如果服用 5~6 天后症状仍无改善，请停止服用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

适应症

因湿疹、斑疹引起的瘙痒、鼻炎、荨麻疹

用法用量


成人（15 岁以上）每次服用 1 片，1 天 2 次（早晚各一次），请咀嚼或在口中溶解后服用。
请勿让未满 15 岁的儿童服用。

<用法用量相关的注意事项>

(1) 请严格遵守规定的用法用量。

(2) 片剂的取出方法

请按照右图所示，用指尖用力按压装有片剂的泡罩凸起部分，挤破背面的薄膜，然后取出药片服用。（如果不小心连同泡罩一起吞下，则可能会导致如刺穿食道粘膜等意外事故发生。）



成分及其功能


成人每日剂量（2 片）中含有以下成分。

| 成分 | 分量 | 功能 |
|------|-----|-----------------------|
| 美唑他嗪 | 4mg | 通过其抗过敏作用，有效抑制皮肤瘙痒和鼻炎。 |

作为添加剂，含有 D-甘露醇、硅酸铝镁、羟丙基纤维素、鞣酸、三氯蔗糖、交联聚维酮、阿斯巴甜（L-苯丙氨酸化合物）、枸橼酸水合物、L-薄荷醇、硬脂酸镁和香料。

保管及使用的注意事项

- (1) 请避免阳光直射，阴凉干燥处保存。
- (2) 请存放在儿童接触不到的地方。
- (3) 请不要更换容器。
(容易导致误用和变质。)
- (4) 请不要服用过期的产品。



销售商

田边制药株式会社

大阪市中央区道修町 3-2-10

制造销售商

Teika 制药株式会社

富山市荒川一丁目 3 番 27 号