

使用本藥劑前，請務必閱讀本說明書。
此外，請妥善保管以便需要時能夠閱讀。

Medipure® ST

類固醇軟膏

販售名稱：Medipure ST

第2類醫藥品

濕疹、皮膚炎治療藥 含合成腎上腺皮質激素 皮膚外用藥

濕疹、皮膚炎是由刺激或過敏反應引起的發炎，大多時候患部會有紅腫、起疹並伴隨發癢症狀。Medipure ST 的主成份為潑尼松龍（合成腎上腺皮質激素）及甘草次酸（抗發炎成份），可緩和濕疹、皮膚炎等發炎症狀。也可用於敏感部位既薄又容易滲透藥劑的皮膚，是無香料、無著色、無防腐劑的軟膏型外用藥劑。

⚠ 使用注意事項

⊗ 禁止事項

（違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用）

1. 請勿使用於下列部位。
水痘、足癬或體癬等，或已化膿的患部。
2. 請勿廣範圍使用於臉部。
3. 請勿長期使用。



■ 慎用事項

1. 下列情況者於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 孕婦或可能懷孕者。
- (3) 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
- (4) 患部範圍較廣者。
- (5) 浸潤或潰爛嚴重者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢、腫脹、斑疹、乾燥感、刺激感、灼熱感、刺痛感
皮膚（患部）	足癬或體癬等白癬、青春痘、化膿症狀、持續的刺激感

3. 即使使用 5~6 天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，並攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

效能 發癢、斑疹、濕疹、皮膚炎、蚊蟲叮咬、痱子、蕁麻疹、凍瘡

用法用量 1日 1~4 次，請取適量塗抹於患部。

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。
- (3) 請注意避免接觸眼睛。萬一誤入眼中，請立即以水或溫水清洗。
若症狀極為嚴重，請前往眼科接受治療。
- (4) 僅限外用。

成份（1g 內含）

成分	含量	功效
潑尼松龍（合成腎上腺皮質激素）	2.5 mg	可抑制皮膚的發炎、腫脹
甘草次酸	5 mg	可抑制皮膚的發炎、腫脹

添加物：山梨坦硬脂酸酯、硬脂酸、肉荳蔻酸異丙酯、角鯊烷、石蠟、凡士林

保管及使用上的注意事項

- (1) 請密封保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



販售商
田邊製藥株式會社
大阪市中央區道修町 3-2-10

生產販售商
Teika 製藥株式會社
富山市荒川一丁目 3 番 27 號