

使用本品前，请一定阅读本说明书。  
此外，请妥善保管以便在需要的时候阅读。

# Medipure® ST

## 类固醇软膏

商品名：Medipure ST

第2类医药品

湿疹·皮炎治疗药 合成肾上腺皮质激素复方制剂 皮肤外用剂

湿疹、皮炎是因异物刺激和过敏反应等引起的皮肤炎症，多数情况下，患部会变得红肿、起疹和伴有瘙痒。Medipure ST 是一种外用制剂，通过主要成分泼尼松龙（合成肾上腺皮质激素）和甘草次酸（抗炎成分）的作用抑制湿疹、皮炎等炎症。是一种不含着色剂、香料和防腐剂的软膏类外用制剂，可用于敏感区域等药物容易渗透且较薄的皮肤。

### ⚠ 使用注意事项

#### ⊗ 禁止事项

（违反时则症状加重或易出现副作用）

1. 请不要用于下述部位。  
水痘、脚癣或顽癣等的部位或化脓的患处。
2. 请不要在脸上大范围使用。
3. 请不要长期连续使用。



#### ⚠ 慎用事项

1. 以下人士在使用前应咨询医生、药剂师或登录贩卖者。  
(1) 正在接受医生治疗的患者。  
(2) 孕妇或有可能怀孕的患者。  
(3) 有药物等过敏史的患者。  
(4) 患处范围较大的患者。  
(5) 湿润或糜烂较为严重的患者。
2. 使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒、肿胀、斑疹、干燥感、刺激感、热感、刺痛感
皮肤（患处）	脚癣或顽癣等白癣、青春痘、化脓症状、持续性刺激感

3. 若使用 5~6 天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者。

**功能** 瘙痒、斑疹、湿疹、皮炎、蚊虫叮咬、疖子、荨麻疹、冻疮

**用法用量** 1 天 1~4 次，请取适量涂抹于患处。

#### <用法用量相关的注意事项>

- (1) 请严格按用法用量使用。
- (2) 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- (3) 请注意避免接触到眼睛。不慎入眼时立即用冷水或温水进行清洗。  
并且，症状严重时应前往眼科就诊。
- (4) 仅限外用。

#### 成分（1g 内）

成分	含量	功能
泼尼松龙（合成肾上腺皮质激素）	2.5 mg	抑制皮肤的炎症、肿胀
甘草次酸	5 mg	抑制皮肤的炎症、肿胀

辅料：山梨醇硬脂酸酯、硬脂酸、肉豆蔻酸异丙酯、角鲨烷、石蜡、凡士林

#### 保管及使用的注意事项

- (1) 密闭保管在避免阳光直射、干燥的阴凉场所。
- (2) 请在儿童接触不到的地方保存。
- (3) 请勿转移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- (4) 请勿使用过期产品。



销售商

田边制药株式会社  
大阪市中央区道修町 3-2-10

制造销售商

Teika 制药株式会社  
富山市荒川一丁目 3 番 27 号