

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

OKINAZOLE®L100 第1類醫藥品 念珠菌陰道炎復發治療藥 陰道用外用藥

念珠菌陰道炎是由一種叫念珠菌的真菌（黴菌的一種）引起的陰道發炎。罹患念珠菌陰道炎會引起外陰部發癢、分泌物的外觀及量也會發生變化、有時會伴隨外陰部灼熱、疼痛、腫脹感。分泌物的特性呈念珠菌陰道炎特有的白粥（茅屋起司）狀、白濁的酒粕狀。本藥劑為改善念珠菌陰道炎症狀的治療藥。

本藥劑僅限於過去曾被醫師診斷念珠菌陰道炎，並接受過治療的患者使用。

使用注意事項

禁止事項

（違反時可能導致症狀加重或容易出現副作用）

- 下列情況者請勿使用。
 - 過去不曾被醫師診斷出念珠菌陰道炎，也沒有接受過治療者。
 - 念珠菌陰道炎反覆復發者（2個月內復發1次或6個月內復發2次以上）（如短期間內反覆復發，可能罹患糖尿病等其他疾病）。
 - 不確定念珠菌陰道炎是否復發者（分泌物不是白粥（茅屋起司）狀、白濁的酒粕狀、但有異味，可能是其他疾病）。
 - 有發燒、發冷情況者。
 - 有噁心、嘔吐情況者。
 - 下腹部疼痛者。
 - 背部或肩部有疼痛情況者。
 - 有不規則出血或異常出血、分泌物中帶著血者。
 - 陰道或外陰部有潰瘍、水皰、疼痛者。
 - 排尿有疼痛感或是排尿困難者。
 - 曾被診斷過下列疾病者：糖尿病
 - 正在使用可邁丁片（Warfarin）等抗凝血劑者。
 - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀者。
 - 孕婦或可能懷孕者。
 - 未滿15歲之兒童或60歲及以上之高齡者。
- 在使用本藥劑期間請勿在外陰部使用下列醫藥物。
念珠菌症治療藥以外的皮膚外用藥



諮詢事項

- 下列情況者於使用前，請先向醫師、藥劑師諮詢。
 - 正在接受醫師治療者。
 - 正在哺乳者。
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀者。
- 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，請攜帶此文件向醫師、藥劑師諮詢。

相關部位	症狀
陰道	疼痛（抽痛）、腫脹感（發腫）、發紅、刺激感、搔癢、灼熱感

- 使用3天後症狀仍無改善，或使用6天後症狀仍不消失，請停止使用，請持本說明書接受醫師治療。

效

能

防止念珠菌陰道炎復發（僅限於過去曾被醫師診斷念珠菌陰道炎，並接受過治療的患者。）

成份（1片內含）

硝酸奧希康那唑..... 100mg
（添加物：乳糖水合物、微晶型纖維素、羥丙纖維素、單水檸檬酸、硬脂酸鎂）

用法用量

成人（15 歲以上未滿 60 歲）1 次 1 片，將藥劑放進陰道深處（睡前使用最好）。請連續使用 6 天。但是，如使用 3 天後症狀仍無改善或使用 6 天後症狀仍不消失的情況下請接受醫師治療。

年齡	1 次劑量	使用次數
成人（15 歲以上未滿 60 歲）	1 片	1 日 1 次
未滿 15 歲或 60 歲及以上	不可使用	

<用法用量相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
 - (2) 本藥劑僅限可用於陰道內、請勿吞服。如果發生誤吞的情況，請立刻接受醫師治療。
 - (3) 使用期間即使症狀已經消失，也請持續使用 6 天。
 - (4) 生理期間請勿使用。如果使用期間生理期來了的話，請停止使用。該情況下為確認是否治癒等狀況，請接受醫師治療。（生理期間藥劑可能無法充分發揮效果。）
- ※本藥劑在陰道中發揮效果後，會慢慢地被排除體外，因此可能會出現白色固狀或糊狀分泌物。

陰道藥劑的使用方法

取出方法

請用肥皂清潔手指，如右圖，請用指頭用力壓 PTP 鋁箔裝有陰道藥劑的凸面，擠破背面的鋁箔紙，取出 1 片本藥劑。（如誤將鋁箔與藥劑一起使用，會導致刺傷黏膜等意外事故。）

放入方法

將兩腳打開並蹲下，如右圖一般用指尖將陰道藥劑推放至陰道內最深處。（請勿使用塗藥器等物品。）放入後請仔細清潔接觸患部的手指。藥劑沒有規定放入方向，但建議由細的那頭開始放入。



保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於不會直射日光、濕度較低之涼爽場所。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝至其他容器中。（可能會造成誤食或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



生活上的注意事項

- (1) 念珠菌陰道炎復發的情況下可能傳染給伴侶，請告知伴侶自己感染了念珠菌陰道炎，如伴侶的陰部有發癢、發紅等症狀，請立刻接受醫師治療。
 - (2) 為避免傳染給伴侶，使用本藥劑期間請避免性行為。
 - (3) 使用本藥劑期間，為避免刺激患部，請勿使用殺精劑。
 - (4) 為維持藥效，請勿自行清洗陰道內部。
 - (5) 洗澡時為避免肥皂刺激，請不要用肥皂清洗外陰部，請用溫水稍微清洗即可。
 - (6) 念珠菌在溫度或濕度較高的環境中容易繁殖，盡量保持在乾燥狀態是非常重要的。
- 請注意以下幾點：
- 洗澡、游泳後請將陰道外部擦乾。如穿著濕泳衣等請盡快更衣。
 - 如使用護墊等衛生用品時請頻繁的更換。
 - 貼身衣物請選用透氣性良好的棉質製品。
- (7) 請每天使用乾淨的貼身衣物及毛巾。為避免傳染，請勿與家人共用毛巾等物品。
 - (8) 念珠菌也常存於腸內。為避免被腸內菌感染，如廁後請由前往後擦拭。
 - (9) 即使感覺發癢，也請不要抓撓外陰部。抓撓可能導致刺激感加重，擴大感染。



生產販賣商
田邊製藥株式會社
大阪市中央區道修町 3-2-10