

第 2 類醫藥品

日本藥典苯磺酸貝托斯汀藥錠

過敏專用鼻炎藥

TALION[®]AR

- 因除了有抗組織胺作用還有抗發炎作用，所以不僅對打噴嚏、流鼻水，對鼻塞也能發揮效果。
- 不易嗜睡、不易口乾、對日常生活影響較小的第 2 世代抗組織胺藥。
- 早晚各服用 1 錠，可維持 1 整天的效果。
- 可在空腹時服用。

⚠ 使用上的注意事項

⊗ 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

1. 下列的人請勿服用。
 - (1) 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
 - (2) 未滿 15 歲的兒童。
 - (3) 接受過下列診斷的人。腎臟病
2. 使用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品。
其他過敏用藥（包含鼻炎用內服藥、皮膚疾病用藥）、含有抗組織胺劑的內服藥等
（感冒藥、鎮咳祛痰藥、暈車藥、鎮靜催眠藥等）
3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類
（可能出現嗜睡等。）
4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳。
5. 服用前後，請勿飲酒。



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。
 - (1) 正在接受醫師治療的人。
 - (2) 孕婦或可能懷孕的人。
 - (3) 年長者。
 - (4) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
 - (5) 不確定症狀是因過敏引起或是因其他原因引起的人。
 - (6) 曾接受支氣管氣喘、異位性皮膚炎等其他過敏疾病診斷的人。
2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此附件諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、腫脹、蕁麻疹
消化器官	噁心、嘔吐、胃痛、胃部不適感、舌炎、腹痛
精神神經系統	倦怠感、頭痛、頭重感、頭暈
泌尿器官	血尿、尿量減少、排尿困難
其他	月經異常、浮腫、心悸、呼吸困難、痠麻、味覺異常

3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此附件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、嗜睡、便秘、腹瀉

療效

緩和因花粉、屋塵（室內灰塵）等引起的下列鼻子過敏症狀：
打噴嚏、流鼻水、鼻塞

用法用量

成人（15歲以上）1次1錠，1天2次，於早晚服用。

年齡	1次劑量	服用次數
成人（15歲以上）	1片	1天2次 早晚
未滿15歲	請勿服用	

<用法用量相關的注意事項>

- (1) 請嚴格遵守規定的用法用量。
- (2) 針對因花粉引起的過敏症狀服用時，從花粉飛散預測日開始或剛出現症狀時及早服用可獲得更好的效果。
- (3) 持續服用，會有效果。
- (4) 即使服用1週後也未見成效又或是即使症狀獲得改善，但服用超過2週時，請向醫師或藥劑師諮詢。
- (5) 錠劑的取出方法
如右圖用手指用力壓 PTP 鋁箔裝著藥的凸處，擠破背面的鋁箔紙後，取出服用。（如誤將藥劑與包裝一起服下，會導致刺傷食道黏膜等意外事故。）



成份（1日用量：2片中）

苯磺酸貝托斯汀···20mg

添加物：硬脂酸鎂、纖維素、滑石粉、羥丙基甲基纖維素、聚乙二醇、D-甘露醇

保管及使用上的注意事項

- (1) 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。
- (2) 請保管於兒童拿不到的地方。
- (3) 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）
- (4) 請不要使用過期的製品。



生產販賣商
田邊製藥株式会社
大阪市中央區道修町3-2-10