

第2类医药品

日本药典苯磺酸贝托斯汀片

TALION<sup>®</sup>AR

抗过敏专用鼻炎药

- 本药剂除具有抗组胺作用外，还具有抗炎症的作用，因此不仅针对打喷嚏、流鼻涕，针对鼻塞也能发挥效果。
- 本药剂是一种不易使人犯困、口干，对日常生活影响较小的第2代抗组胺药。
- 早晚各服用1片，效果可持续1天。
- 空腹时也可服用。

△使用注意事项

⊗ 禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

1. 下述人群请不要服用。
  - (1) 因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
  - (2) 未满15岁的儿童。
  - (3) 接受以下诊断的人群。肾脏病
2. 在服用本药剂期间，不要服用下述任何医药品。  
其他抗过敏药（包括鼻炎用内服药、皮肤疾病用药）、含抗组胺剂的内服药等（感冒药、镇咳祛痰药、晕车药、催眠镇静药等）
3. 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类  
（会出现嗜睡症状。）
4. 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。
5. 服用前后不要饮酒。



咨询事项

1. 以下人群在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。
  - (1) 正在接受医师治疗的人群。
  - (2) 孕妇或有其可能性的人群。
  - (3) 老年人。
  - (4) 因药物等出现过过敏症状的人群。
  - (5) 不确定症状是因过敏导致还是其他原因导致的人群。
  - (6) 被诊断为患有其他过敏性疾病，例如患有支气管哮喘和异位性皮肤炎等的人群。
2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症状
皮肤	起疹、肿胀、荨麻疹
消化系统	恶心、呕吐、胃痛、胃部不适、舌炎、腹痛
精神神经系统	倦怠感、头疼、头重感、头晕
泌尿系统	血尿、尿量减少、排尿困难
其他	月经异常、浮肿、心悸、气闷、发麻、味觉异常

3. 服用后有出现以下症状的可能，如这些症状持续或加重的话，请立即停药，并持此说明书向医师、药剂师或登录贩卖者咨询。  
口腔干燥、嗜睡、便秘、腹泻

## 效能

缓解因花粉、屋尘（室内灰尘）等引起的下述鼻子过敏症状：  
打喷嚏、鼻涕、鼻塞

## 用法用量

成人（15 岁以上） 每次服用 1 片，每天服用 2 次，早晚服用。

年龄	单次用量	服用次数
成人（15 岁以上）	1 片	每天 2 次 早晚
未满 15 岁	不要服用	

### <用法用量相关注意>

- (1) 请严格按用法用量使用。
- (2) 针对花粉引起的过敏症状而服用本药剂时，从预测花粉飘散的预测日期开始，或者症状刚出现时尽早开始服用的话，会有更好的效果。
- (3) 持续服用，会起到效果。
- (4) 若服用 1 周后症状仍无改善，或者虽然症状有所改善但服用期间超过两周时，也请咨询医生或药剂师。
- (5) 片剂的取出方法

如右图，请用手指用力按压装有片剂的 PTP 包装板的凸面，则反面的铝箔包装会被压破开，即可取出药片服用。（如不慎连同包装一同误服的话，有可能造成刺伤食道粘膜等不可想象的严重后果。）




## 成分（单日剂量：2 片中）

苯磺酸贝托斯汀···20mg

辅料：硬脂酸镁、纤维素、滑石粉、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、D-甘露醇

## 保管及使用注意事项

- (1) 请保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。
- (2) 请保管在儿童无法触及的地方。
- (3) 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
- (4) 请不要服用过期的产品。



制造销售商  
田边制药株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10