

以上資料僅供參考，如需了解更多詳情，請參閱產品附件之說明文件。

日本藥典 熊去氧膽酸片

第3類醫藥品

田邊胃腸藥URS O

消化器官用藥

從今以後，要想一直吃飯吃得香，就保養消化器官

因為有肝腸循環...

經腸道吸收的熊去氧膽酸（UDCA），經過肝臟・膽囊後排入腸道內，再經腸道重新吸收。這種循環稱為肝腸循環，UDCA不僅在胃腸，在肝臟・膽囊中也能長時間發揮作用。所以“1天服用1次”就能發揮其“保養消化器官”的功效。

因能促進膽汁酸分泌...

隨著年齡的增長，吃油膩食物後會感到胃脹。其原因之一是由於能幫助消化吸收脂肪的膽汁酸分泌低下。UDCA能促進膽汁酸分泌，從而改善因脂肪引起的“胃脹，消化不良”。

服用注意事項



慎用事項

- 下列情況者請向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢後使用。
 - 正在接受醫生治療的患者。
 - 孕婦或可能懷孕的人。
 - 曾因藥物等引起過敏的人。
- 使用後出現下列症狀時，有可能是副作用，請立即停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有合法販賣許可證者諮詢。

相關部位	症狀
皮膚	皮疹、發紅、搔癢
消化器官	腹瀉，噁心

- 服用2週左右症狀仍未改善的話，應停藥，並持此說明書向醫生、藥劑師或持有販賣許可證者諮詢。

功能

胃脹，消化不良，因消化不良引起的胃・腹脹，食欲不振（食欲減退），消化促進，吃得過多（暴食），胸悶

用法用量

1日1次1片，晚飯前或晚飯後服用。


年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1片	1日1次
未滿15歲	禁止服用	

<用法・用量的注意事項>

(1) 嚴格按用法・用量服用。

(2) 藥片的取出方法。

如右圖，用手指用力按壓包裝板的凸面，則反面的鋁箔包裝會被壓破開，即可取出藥片。（如不慎連鋁箔包裝一同誤咽的話，鋁箔包裝有可能刺傷黏膜，造成不可想像的嚴重後果。）




成份（1日用量：1片中）

熊去氧膽酸50 mg

添加物：羥丙基纖維素，硬脂酸鎂，纖維素，玉米澱粉，羧甲基纖維素鈣，輕質無水矽酸

保管及使用的注意事項

- (1) 請避免日光直射，陰涼乾燥處密封保存。
- (2) 請保存在兒童接觸不到的場所。
- (3) 請不要更換容器。
（容易導致誤用和變質）
- (4) 請不要使用過期的製品。



生產販賣商
田邊製藥株式会社
大阪府中央區道修町 3-2-10