

이 문서는 제품에 대한 참조 정보입니다. 제품에 첨부된 문서를 꼭 확인하시기 바랍니다.

제 3 류의약품

일본약국방 우르소데옥시콜산 정

다나베위장약 우르소

소화기용약

앞으로도 맛 있게 먹을 수 있도록 소화기 멘테넨스

장-간 순환이기 때문에---

장에서 흡수된 우르소데옥시콜산(UDCA)은 간장과 담낭을 거친 후, 장 안에 배출되어 다시 장에서 흡수됩니다. 이 사이클을 [장-간 순환]이라고 하는데, UDCA 는 위장 뿐이 아니라 간장과 담낭에서도 오랜 시간에 걸쳐서 작용하게 됩니다. 그러므로 [1 일 1 회]의 복용으로 [소화기 멘테넨스]에 효과를 발휘합니다.

담즙산의 분비를 촉진하기 때문에---

0나이가 들어서 그런지, 기름진 요리를 먹으면 위에 불쾌감이 난다. 그 것은 지방 등의 소화흡수를 도와 주는 담즙산의 분비 저하가 원인의 하나입니다. UDCA는 담즙산의 분비를 촉진하여 줌으로써, 지방에 기인되는 [위트림과 소화불량]을 개선합니다.

사용상의 주의 사항



상의해야 합니다

- 다음 분은 복용 전에 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.
 - (1) 의사의 치료를 받아 계시는 분.
 - (2) 임부나 임신하고 있을 가능성이 있는 분.
 - (3) 약제 등에 의하여 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 분.
- 복용 후에 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용일 수 있기 때문에, 즉시 복용을 중단하여, 이 첨부문서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.

관계부위	증상
피부	발진-발적, 가려움
소화기	설사, 구토감
- 2 주일 정도 복용을 계속하여도 증상이 개선되지 않는 경우에는 복용을 중단하여, 이 첨부문서를 가지고 의사나 약사 또는 등록판매자에게 상의하여 주십시오.

효능

위트림, 소화불량, 소화불량에 인한 위부-복부 팽만감, 식욕부진(식욕감퇴), 소화촉진, 과식, 가슴 막힘

용법,용량

1일 1회 1정을 저녁 식전 또는 저녁 식후에 복용하여 주십시오.


연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1정	1일 1회
15세 미만	복용하지 마십시오.	

<용법-용량에 관련되는 주의>

(1) 용법-용량을 엄수하여 주십시오.

(2) 정제를 꺼내는 방법

오른 쪽 그림과 같이, 정제가 들어 있는 PTP 시트의 윗면을 손가락으로 세게 눌러 뒷면의 알루미늄 박을 찢어서 1정을 꺼내어서 복용하여 주십시오. (잘 못하여 그냥 복용하면, 점막이 찢리는 등 사고가 일어날 수도 있습니다.)



성분(1 일량:1 정당)

우르소데옥시콜산 50mg

첨가물:히드록시프로필셀룰로오스, 스테아린산 마그네슘, 셀룰로오스, 옥수수 전분, 카멜로스 칼슘, 경질무수규산

보관 및 취급상의 주의사항


(1) 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 선선한 장소에 보관하여 주십시오.

(2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

(3) 다른 용기에 갈아 넣지 마십시오.

꺾이우려가 있으며, 품질이 변할 수 있습니다

(4) 사용 기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



제조 판매 회사

타나베파마주식회사

오사카시 주오구 도쇼마치 3-2-10