第2類医薬品

アスパラ目葉レプラス

目のかすみ・疲れ・かゆみに

Reinvigorate your eyes. The refreshing power of Aspara L PLUS brings a mild, cool sensation to your eyes for relief of eye fatigue and inflammation.



爽やかなさし心地で ピント調節機能を改善

アスパラ目薬Lプラスは、ピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩や目の新陳代謝を活発にするL-アスパラギン酸カリウムとビタミンBeを配合し、かすみ目や疲れ目に効果を発揮します。また、グリチルリチン酸二カリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、テトラヒドロゾリン塩酸塩がかゆみ、充血などの炎症を抑えます。

使用上の注意

≝ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。緑内障
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、 直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録 販売者に相談してください。

関係部位	症状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
	充血、かゆみ、はれ	

- 3.次の場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は 登録販売者に相談してください。
 - (1)目のかすみが改善されない場合。
 - (2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

効能

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼病予防 (水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。 また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



成分(100mL中)

成 分	含量	はたらき
ネオスチグミンメチル硫酸塩	3mg	目のピント調節機能を改善し、 疲れ目を改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	1000mg	細胞に必要なカリウムを補給し、新陳 代謝を活発にして疲れ目を改善します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	100mg	目の新陳代謝を活発にして疲れ目を 改善します。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	充血や目のかゆみなどの炎症を鎮めます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用で目のかゆみなどの 炎症を抑えます。
テトラヒドロゾリン塩酸塩	30mg	目の血管を収縮して充血を抑えます。


添加物: ホウ酸、ホウ酸Na、エデト酸Na水和物、 ℓ -メントール、 $d\ell$ -カンフル、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、プロピレングリコール

〈成分に関連する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸ニカリウムが、涙道を通って口中に流れ出てくることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。 (品質を保持するため車中・暖房器具の近くなど 高温となる場所に保管しないでください。)
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。



(6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



販売元

田辺ファーマ株式会社 大阪市中央区道修町3-2-10

製造販売元

 本品のお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

田辺ファーマ株式会社「くすり相談センター」 (プリーダイヤル 0120-54-7080) 受付時間:弊社営業日の9:00~17:30