

日本薬局方 ウルソデオキシコール酸錠

第3類医薬品

タナベ胃腸薬ウルソ[®]

消化器用薬

これからも、おいしく食べるために
消化器メンテナンス

腸肝循環だから・・・

腸で吸収されたウルソデオキシコール酸（UDCA）は、肝臓・胆嚢を通して腸内に排出され、再び腸で吸収されます。このサイクルを「**腸肝循環**」といい、UDCAが胃腸だけでなく肝臓・胆嚢にも長時間にわたって働きかけます。だから、「**1日1錠**」の服用で「**消化器系のメンテナンス**」に効果を発揮します。

胆汁酸の分泌促進によって・・・

歳を重ねたせいか、脂っこい料理を食べると胃がもたれる。それは脂肪等の消化吸収を助ける胆汁酸の分泌が低下することが原因の一つです。UDCAは胆汁酸の分泌を促進することによって、脂肪による「**胃もたれ、消化不良**」を改善します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、吐き気

- 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効 能

もたれ(胃もたれ)、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化促進、食べ過ぎ(過食)、胸つかえ

用法・用量

1日1回1錠を夕食前又は夕食後に服用してください。


年 齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1錠	1日1回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、1錠取り出して服用してください。(誤ってそのまま服用すると、粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分(1日量:1錠中)

ウルソデオキシコール酸・・・50mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、軽質無水ケイ酸

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

